

Comunicato stampa, 8 novembre 2017

---

## Ultime cifre sulle ferite da decubito e le cadute in ospedale

**L'8 novembre 2016, nelle cliniche pediatriche e negli ospedali acuti svizzeri è stato svolto l'annuale rilevamento dei decubiti e delle cadute. Rispetto all'anno precedente, la frequenza è leggermente aumentata, con l'eccezione del tasso di decubiti di tutte le categorie tra i bambini e gli adolescenti, che ha fatto registrare un calo. La maggior parte dei cambiamenti sono tuttavia statisticamente riconducibili al caso.**

Oltre 13'000 adulti e circa 750 bambini e adolescenti hanno partecipato al rilevamento 2016 perché degenti in uno dei 195 ospedali singoli e gruppi di ospedali, in una delle 31 cliniche pediatriche o in un reparto pediatrico di un ospedale acuto in cui regolarmente si svolgono le misurazioni della qualità dell'ANQ. In un giorno di riferimento, il personale infermieristico rileva la presenza di ferite da decubito e documenta le cadute di pazienti adulti verificatesi in un determinato lasso di tempo.

I tassi calcolati sulla base dei dati rilevati consentono di monitorare l'evoluzione della qualità delle cure in Svizzera. Al contempo, è possibile operare confronti tra ospedali dello stesso tipo, i cui esiti confluiscono direttamente nel processo di miglioramento interno.

### Decubiti tra gli adulti

Il tasso complessivo 2016, che comprende tutte le categorie di decubito\*, è del 4,4%, in aumento dello 0,3% rispetto all'anno precedente. Limitandosi ai decubiti dalla categoria 2, il tasso è pari al 2,0%, in crescita dello 0,1%. Nel confronto internazionale, questi dati si situano nel terzo inferiore dei valori di riferimento. In ambito nazionale, il tasso complessivo di dieci ospedali diverge in modo significativo dalla media di tutti i nosocomi. Per quanto riguarda il tasso dalla categoria 2, tale divergenza si osserva in tre ospedali.

### Decubiti tra i bambini

Rispetto all'anno precedente, il tasso complessivo 2016 (9,9%) è calato dell'1,8%. Considerando solo i decubiti dalla categoria 2, il tasso è pari al 2,6%, in aumento dello 0,9% rispetto al 2015. Questi tassi sono paragonabili a quelli internazionali. A livello svizzero, solo un ospedale (due se si considerano solo i decubiti dalla categoria 2) diverge dalla media complessiva.

Il decubito nosocomiale colpisce in particolare i bimbi minori di un anno ricoverati in neonatologia e in terapia intensiva e con un elevato numero di presidi sanitari. Sta dunque qui il maggiore potenziale di miglioramento della qualità. Occorre tenere presente che neonati e nati prematuri sono particolarmente soggetti a queste ferite a causa della loro pelle ancora immatura.

\* Il decubito nosocomiale è classificabile come segue. Categoria 1: arrossamento della cute intatta che non sparisce alla digito pressione | Categorie 2-6: perdita parziale della cute-perdita completa della cute o dei tessuti, nonché profondità sconosciuta.



### Tassi di caduta tra gli adulti

Tra il 2015 e il 2016, il tasso di caduta (3,8%) è aumentato dello 0,8%. Benché dall'inizio della misurazione si constata un leggero calo dei tassi di caduta in ospedale, in Svizzera essi restano più elevati rispetto all'estero. Solo quattro ospedali si distinguono dalla media di tutti gli istituti. Una caduta è considerata un importante fattore per eventuali altri episodi, e costituisce pertanto una base essenziale per l'adozione di misure di miglioramento.

### Perfezionamento del metodo di misurazione

Il metodo di misurazione «LPZ International» dell'Università di Maastricht è stato completamente rielaborato in vista del rilevamento 2016 tra gli adulti. La rappresentazione dei risultati a livello di ospedale, in particolare, è ora più intuitiva e interattiva. Tra bambini e adolescenti, invece, è stato utilizzato il metodo di misurazione LPZ già in uso precedentemente.

### Confronto pluriennale dei risultati

Tassi di prevalenza adulti	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Decubito nosocomiale, tutte le categorie	<b>4,4</b>	4,1	4,3	4,6	4,4	5,8
Decubito nosocomiale, dalla categoria 2	<b>2,0</b>	1,9	1,8	2,0	1,7	2,1
Caduta in ospedale	<b>3,8</b>	3,0	3,6	4,1	3,8	4,3

Tassi di prevalenza bambini e adolescenti	2016	2015	2014	2013
Decubito nosocomiale, tutte le categorie	<b>9,9</b>	11,7	13,5	15,1
Decubito nosocomiale, dalla categoria 2	<b>2,6</b>	1,7	3,0	2,5

### Rapporto con grafici

<http://www.anq.ch/it/risultati-di-misurazione/risultati-somatica-acuta/>

### Contatto

Daniela Zahnd, collaboratrice scientifica Medicina somatica acuta

Tel. 031 511 38 48, [daniela.zahnd@anq.ch](mailto:daniela.zahnd@anq.ch)

### L'ANQ promuove la qualità negli ospedali e nelle cliniche

L'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) coordina ed effettua misurazioni della qualità nei settori della medicina somatica acuta, della riabilitazione e della psichiatria. I risultati consentono di realizzare un confronto trasparente a livello nazionale. Sulla base di questi rilevamenti, gli ospedali e le cliniche possono adottare provvedimenti mirati per il miglioramento della qualità. I membri dell'ANQ sono l'associazione H+, santésuisse, gli assicuratori sociali federali, i Cantoni e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. L'ANQ non è un'associazione a scopo di lucro.

Maggiori informazioni: [ANQ](#)