

Misurazione delle prevalenze caduta e decubito 2019

Facts & Figures



Berner Fachhochschule



Pazienti partecipanti:
13'240/17'464

Ospedali/sedi partecipanti:
193

Tasso di partecipazione:
75,8%



50,9%
6'736/13'240

Età: **ø 67,4**
Min. **18** Mass. **109**



49,1%
6'504/13'240

CADUTA



Fattori di rischio di caduta

- Un maggior numero di giorni dall'ammissione
- Dipendenza assistenziale prevalente
- Caduta nell'anamnesi
- Sedativi e/o medicinali che influenzano il comportamento

Tasso di caduta in ospedale



Totale:
3,7%
484/13'240



Tra i pazienti a rischio:
6,6%
261/3'930

Tasso di lesioni



34,5% Totale
167/484


20,5% Lesioni minime
99/484

5,0% Lesioni medie
24/484

9,1% Lesioni gravi
44/484



Prevalenza nosocomiale del decubito



Prevalenza complessiva:

3,9%
510/13'240

Categoria ≥ 2 :

1,7%
222/13'240




Prevalenza complessiva (pazienti a rischio):

11,0%
461/4'179

Categoria ≥ 2 (pazienti a rischio):

4,8%
199/4'179

DECUBITO



Decubito nosocomiale

secondo la classificazione EPUAP (n=639)*

59,2% Categoria 1

30,8% Categoria 2

4,2% Categoria 3

1,1% Categoria 4

2,5% Non stadiabile: profondità sconosciuta

2,2% Sospetto danno profondo del tessuto: profondità sconosciuta

*Il numero di decubiti nosocomiali è superiore a quello dei pazienti con decubito nosocomiale (prevalenza) in quanto alcuni pazienti avevano più di un decubito.



Fattori di rischio del decubito

- Rischio di decubito secondo la valutazione clinica soggettiva da parte degli infermieri
- Dipendenza assistenziale completa
- Un maggior numero di giorni dall'ammissione
- Un intervento chirurgico nelle due settimane precedenti