


POSTOPERATIVE WUNDINFEKTIONEN SWISSNOSO



- Elektive Knieprothesen
- Magenbypassoperationen
- Appendektomien (Blinddarmentfernung)
- Rektumchirurgie (Enddarmoperation)
- Cholezystektomien (Gallenblasenentfernung)
- Hysterektomien (Gebärmutterentfernung)
- Hernienoperationen (Leistenbruchoperation)

AUSGEWÄHLTE EINGRIFFSARTEN

Colonchirurgie (Darmchirurgie)



Laminektomien (Wirbelsäulenchirurgie)



ohne Implantat

Sectio caesarea (Kaiserschnitt)



Elektive Hüftprothesen





mit Implantat

Herzchirurgie



Anzahl Spitäler/Kliniken



Anzahl Patientinnen und Patienten

5'137

2'418

4'766

13'087

3797

MESSERGEBNISSE 2020



Infektionsrate

Anteil Wundinfektionen

659/12.8%

32/1.3%

84/1.8%

119/0.9%





118/3.1%

Infektionstiefen

● Oberflächliche Infektionen

● Tiefe Infektionen

● Organ-/Hohlrauminfektionen



Follow-up

Anteil Eingriffe mit komplettem Follow-up (Nachverfolgung)

Follow-up-Dauer
– ohne Implantat: 30 Tage
– mit Implantat: 1 Jahr



Zeitgerechte Antibiotikaphylaxe

Anteil der Patientinnen und Patienten, die innerhalb einer Stunde vor der Operation eine Antibiotikaphylaxe erhielten



Detaillierte Messergebnisse:



www.anq.ch



TREND: Bei den fünf hier aufgeführten Eingriffsarten geht die Infektionsrate seit 2011 tendenziell zurück.