

# Cifre e fatti medicina somatica acuta

## Misurazioni ANQ 2021

### INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO SWISSNOSO




- Protesi elettive dell'anca
- Appendicectomie
- Laminectomie
- Colecistectomie
- Taglio cesareo
- Interventi di ernia
- Bypass gastrici
- Chirurgia del colon
- Chirurgia rettale
- Isterectomie
- Protesi elettive del ginocchio
- Chirurgia cardiaca

### TIPI DI INTERVENTO SELEZIONATI



Numero di ospedali/cliniche



Numero di pazienti

3'817

185

1'134

8'155

3'044

### RISULTATI 2021



Tassi di infezione  
Infezioni del sito chirurgico

475/12.4%

32/17.3%






53/4.7%

77/0.9%

99/3.3%

Profondità

- Infezioni superficiali
- Infezioni profonde
- Infezioni agli organi/alla cavità



Follow-up

Tasso di interventi con follow-up completo  
Durata del follow-up  
- Senza impianto: 30 giorni  
- Con impianto: 1 anno



Profilassi antibiotica tempestiva

Tasso di pazienti che hanno ricevuto la profilassi antibiotica nell'arco di un'ora prima dell'inizio dell'operazione



Risultati dettagliati della misurazione:



www.anq.ch



**TENDENZA:** dal 2011, il tasso di infezioni è in calo dopo interventi di chirurgia del colon e cardiaca, in aumento dopo interventi di chirurgia rettale, e stabile dopo isterectomie e protesi elettive del ginocchio. Rispetto al 2020, la profilassi antibiotica è migliorata per tutti gli interventi, tranne le protesi del ginocchio.