



## Medicina somatica acuta – infezioni del sito chirurgico

---

→ [Informazioni sulla misurazione](#)

Metodo di misurazione: programma SSI Surveillance di Swissnoso

### Fattori da considerare al momento di interpretare i risultati

- **Contesto:** le infezioni del sito chirurgico non possono essere evitate del tutto e non tutti gli interventi comportano lo stesso rischio. L'obiettivo di un'operazione (p.es. il lenimento del dolore) può essere raggiunto nonostante l'insorgere di un'infezione.
- **Aggiustamento secondo il rischio:** la procedura statistica dell'aggiustamento secondo il rischio (compensazione delle differenze a livello di offerta di prestazioni, di infrastruttura, di collettivo di pazienti e di dimensioni del campione) non è in grado di correggere tutte le differenze tra gli istituti.
- **Qualità del rilevamento:** la qualità dei processi di rilevamento dei dati viene valutata con l'ausilio di strumenti standardizzati (validazione). Una bassa qualità può distorcere i tassi.
- **Confronto internazionale:** un confronto con altri paesi è possibile solo con riserva. Metodo, qualità del rilevamento e monitoraggio dopo la dimissione variano sensibilmente. In Svizzera, il rilevamento è più approfondito e prolungato, il che spiega in parte come mai i tassi del nostro paese sono più alti rispetto all'estero.