


### INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO SWISSNOSO





- Protesi elettive del ginocchio
- Appendicectomie
- Laminectomie
- Colecistectomie
- Isterectomie
- Chirurgia vascolare arteriosa degli arti inferiori
- Bypass gastrici
- Chirurgia del colon
- Chirurgia rettale
- Taglio cesareo
- Protesi elettive dell'anca
- Chirurgia cardiaca

### TIPI DI INTERVENTO SELEZIONATI



**Numero di ospedali/cliniche**



**Numero di pazienti**

5'158

291

4'563

12'055

2'743

### RISULTATI 2022



**Tassi di infezione**

Infezioni del sito chirurgico

604/11.7%

32/11.0%






97/2.1%

92/0.8%

73/2.7%

**Profondità**

- Infezioni superficiali
- Infezioni profonde
- Infezioni agli organi/alla cavità



Per le protesi dell'anca, vengono registrate solo le infezioni degli organi/della cavità.

**Follow-up**

Tasso di interventi con follow-up completo

Durata del follow-up  
– Senza impianto: 30 giorni  
– Con impianto: 90 giorni



**Profilassi antibiotica tempestiva**

Tasso di pazienti che hanno ricevuto la profilassi antibiotica nell'arco di un'ora prima dell'inizio dell'operazione



Risultati dettagliati della misurazione:



[www.anq.ch](http://www.anq.ch)



**TENDENZA:**

Dall'inizio del monitoraggio nel 2011, in otto tipi di intervento si rileva una riduzione significativa dei tassi di infezione, in tre tipi una tendenza calante statisticamente non significativa e in altri tre un aumento significativo.