

INFECTIONS DU SITE CHIRURGICAL SWISSNOSO



- Prothèses de genou en électif
- Appendicectomies (ablation de l'appendice)
- Laminectomies (opération de la colonne vertébrale)
- Cholécystectomies (ablation de la vésicule biliaire)
- Hystérectomies (ablation de l'utérus)
- Chirurgie vasculaire artérielle des membres inférieurs
- Bypass gastrique

TYPES D'INTERVENTION SÉLECTIONNÉS



Nombre hôpitaux / cliniques



Nombre de patient-e-s

Chirurgie du côlon
(chirurgie du gros intestin)



Chirurgie du rectum



sans implant

Césarienne




Prothèses de hanche en électif



avec implant

Chirurgie cardiaque



RÉSULTATS DE LA MESURE 2022







Taux d'infection

Proportion d'infections du site chirurgical



Profondeurs des infections

- Infections superficielles
- Infections profondes
- Infections d'organe/espace



Pour les prothèses de hanche, seules les infections de l'organe/espace sont enregistrées.

Suivi

Proportion d'interventions avec suivi complet

Durée du suivi
– sans implant : 30 jours
– avec implant : 90 jours



Antibioprophylaxie en temps opportun

Proportion de patient-e-s ayant reçu une antibioprophylaxie dans l'heure précédant l'intervention chirurgicale



Les résultats de la mesure en détail :



www.anq.ch



TENDANCE : Depuis le début de la surveillance en 2011, une baisse significative des taux d'infection a été observée pour 8 types d'interventions, tandis qu'une tendance à la baisse non statistiquement significative a été observée pour 3 interventions et une augmentation significative pour 3 autres.