


Facts & Figures Akutsomatik


ANQ-Messungen Eingriffe 2022–2023

POSTOPERATIVE WUNDINFEKTIONEN SWISSNOSO





- Elektive Hüftprothesen
- Magenbypassoperationen
- Appendektomien (Blinddarmentfernung)
- Laminektomien (Wirbelsäulenchirurgie)
- Cholezystektomien (Gallenblasenentfernung)
- Sectio caesarea (Kaiserschnitt)
- Gefässchirurgische Eingriffe an Arterien der unteren Extremitäten



AUSGEWÄHLTE EINGRIFFSARTEN



Anzahl Spitäler/Kliniken





Anzahl Patientinnen und Patienten



MESSERGEBNISSE 2023







Infektionsrate
Anteil Wundinfektionen



Infektionstiefen

- Oberflächliche Infektionen
- Tiefe Infektionen
- Organ-/Hohlrauminfektionen



Es werden nur Organ-/Hohlraum Infektionen registriert.

Follow-up

Anteil Eingriffe mit komplettem Follow-up (Nachverfolgung)

Follow-up-Dauer
– ohne Implantat: 30 Tage
– mit Implantat: 90 Tage



Zeitgerechte Antibiotikaphylaxe

Anteil der Patientinnen und Patienten, die innerhalb einer Stunde vor der Operation eine Antibiotikaphylaxe erhielten



Detaillierte Messergebnisse:



www.anq.ch



TREND: Seit 2011 ist die Infektionsrate nach Colonchirurgie, elektiven Knieprothesen und Herzchirurgie rückläufig. Ein Anstieg ist nach Rektumoperationen und nach Hysterektomien zu beobachten. Über 50% der Infektionen werden nach der Entlassung aus dem Spital/der Klinik diagnostiziert.